

Rastande vadare vid
Hyllingens naturreservat sommaren 2007

Text: Mats Thorin Foto: Peter Hörenius



Rastande vadare vid Hyllingens naturreservat sommaren 2007.

De som bor i södra Sverige har ju fått vara med om de stora stormarna "Gudrun" och "Per". Men vi som bor i Aneby har fått vara med om ytterligare ett naturfenomen. Vi fick nämligen vara med om de längsta "fruntimmersveckorna" någonsin. Under sex veckor kom det över 350 mm regn. Vårt lilla Aneby blev plötsligt rikskänt. Det nämndes i TV och radio, och de stora tidningsdrakarna Expressen och Aftonbladet gjorde stora reportage. Det intensiva regnet gjorde att en del dammfästen brast, och vägen mellan Blå Grindar och Bredestad blev så underminerad så man blev tvungen att stänga av den för all biltrafik. Stalpets vattenfall blev en stor turistattraktion, och det lilla fiket som ligger där fick gå för högtryck.



Stalpets vattenfall

Det var torsdagen den 21 juni som det började regna. När kvällen kom, så hade det fallit hela 98 mm. Det fortsatte att regna över hela midsommarhelgen, och den 26 juni kom det 86 mm. Totalt under tiden 21-30 juni uppmättes hela 229 mm regn. Dessa mätningar är då gjorda hos en privatperson som bor i den södra delen av Aneby samhälle. Redan efter ett par dagar började man se att vattnet steg upp på maderna. Det började då stiga på fälten som ligger väster om Hyllingen. Fåglarna var inte sena att utnyttja detta. Det formligen myllrade av gäss, änder, måsar och vadare. Efter en vecka hade vattnet stigit så mycket, så att all mark på den västra sidan låg under djupt vatten. Nu var det i stället den östra sidan, som lockade till sig rastande fåglar. Under juli månad kom det ytterligare 125 mm regn. När man pratade med personer runt Aneby så märkte man hur olika regnet föll, till exempel Frinnaryd fick under samma period 220 mm i juni och 107 mm i juli. När vi kom in i juli månad så var det fälten söder om Hyllingen-dungen som var bäst ur fågelsynpunkt, och så var det under större delen av denna månad. Jag har nu bott 44 år i närheten av Hyllingen, och inte ens under de kraftigaste snösmältningarna har jag sett så mycket vatten.

Den 15 juli hade vattnet nått sitt maximum. Det låg nu ca 1,80 cm över det normala. Hyllingen hade nu blivit så som vi en gång hade drömt om att den skulle se ut, och vi i fågelklubben hade unika möjligheter att studera rastande fåglar. Regnet hade ju kommit lägligt, eftersom det är vid midsommartid som de första vadarna börjar sträcka mot söder. Tyvärr är det också semester vid denna tid, men jag tycker ändå att vi fick en mycket bra täckning av rastande fåglar hela denna sommar. Det har inte varit någon organiserad räkning, utan det var upp till var och en att vara ute och räkna rastande fåglar. Jag har i denna sammanställning bara tagit med observationer som är rapporterade på "Svalan". Under sommaren är det följande dagar som det inte har rapporterats några fåglar ifrån Hyllingen, 24 juni, 3-6 juli, 11-12 juli, 25 aug. och 27 aug.

Mindre strandpipare *Charadrius dubius*

1 ex 1K 27-28 juli, 2 ex 30 juli, 1 ex 1K 2 aug. och 2 ex 5 aug.

Endast fyra observationer av mindre strandpipare verkar något märkligt. Dess närmsta släkting den större strandpiparen noterades under hela 31 obsdagar. Observationerna gjordes under en ganska kort tidsperiod 27 juli- 5 aug. vilket faller väl in i den tid som det flesta mindre strandpiparna brukar passera Hyllingen.

Under åren 1979-87, 1990-01 och 2004-05 har den mindre strandpiparen funnits som häckfågel på några lokaler i närheten av Hyllingen. Sådana år har observationerna vid sjön av förklarliga skäl ökat.



Peter Hörenius © 2007


Mindre Strandpipare

Större strandpipare *Charadrius hiaticula*

Den större strandpiparen observerades under 31 dagar, och lågt räknat passerade minst 135 individer. Det största antalet rastande större strandpipare vi har haft tidigare är 14 ex från 1982, detta överträffades i år vid fem tillfällen, och det nya dagsrekordet är nu 25 ex. Endast en observation gjordes av sträckande fåglar, och det var den 9 aug. då 12 ex sträckte mot söder.

Under 80-talet gjordes nästa årliggen (ej 1987) 3-10 fynd, sedan minskade arten och under 90-talet gjordes bara 1-3 fynd. Detsamma gäller även för 2000-talet, men med ett stort undantag och det är 2005 då hela 10 fynd gjordes.

I stapeldiagrammet nedan kan man utläsa en kraftig sträcktopp 31 juli- 3 aug. sedan har vi några enstaka toppar den 8 aug. och 23 aug.



Ljungpipare *Pluvialis apricaria*

De stora vattenytorna lockade inte några större antal med ljungpipare att rasta. Den första ljungpiparen observerades den 28 juli, två dagar senare sågs 6 ex och det var säkert dessa som sträckte mot SV den 31 juli. Under augusti observerades 1-6 ex under 11 observationsdagar, dessa var jämnt spridda under hela månaden. I september sågs 1-4 ex fram till den 11:e som blev sista datum för ljungpiparen.

Även under "normala" somrar är ljungpiparen sparsam som både sträck- och rastfågel vid Hyllingen.

Kustpipare *Pluvialis squatarola*

1 ad 15 juli, 1 ad 20 juli, 1 1K 23 juli, 2 str. SV 26 juli, 6 rast. sedan str. SV 26 juli, 1 ad 29 juli, 2 ex 30 juli, 9 ex 2 aug. 2 ad 3 aug. 1 ad 4 aug. 13 ex 5 aug. 1 ad 6 aug. 1 ad 13-15 aug. 3 ad 16 aug. och 2 ad 17 aug.

Utan tvekan den art som stod för den största överraskningen, hela 15 fynd under perioden 15 juli- 17 aug. Lågt räknat så kan det ha rört sig om 40 olika individer. Tyvärr är inte många av kustpiparna åldersbestämda, men vad jag minns så var de flesta adulta fåglar.

Under åren 1974-1999 gjordes 25 fynd, och under åren 2000-2006 var det 8 fynd. Ca 80% av kustpipare utgörs av sträckande fåglar, och den största flocken var på 22 ex den 18 aug. 2003. Som mest har vi tidigare haft 3 fynd under ett och samma år.

Tofsvipa *Vanellus vanellus*

40-110 ex 21-30 juni, 16-175 ex 1-15 juli, 20-155 ex 16-31 juli, 30-175 ex 1-15 aug. 50 -165 ex 16-23 aug. och 47 ex 29 sep.

Tofsviporna rastade mycket utspridda i hela dalen, och vissa dagar även vid Herrestad. Därför var det stora variationer i antalet rapporterade individer. Man kan nog räkna med att 150-175 ex rastade hela sommarn. Vilket överensstämmer med hur det brukar se ut "normala" år.



Peter Hörenius © 2007

Tofsvipa

Kustsnäppa *Calidris canutus*

3 ad 29 juli, 1ad 30 juli- 1 aug. och 4 ex 2 aug.

Det är inte ofta som kustsnäppor går ned och rastar hos oss. Dessa 3 fynd var därför mycket glädjande. Vi noterade i år alltså lika många fynd som vi tidigare haft under alla år som det har skådats fåglar i Aneby. Notera hur koncentrerat observationerna var till månadsskiftet juli/augusti.

De tre tidigare fynden i Aneby är: 1ad Ralången 20 juli 1983, 11ex Ralången 31 juli 1989 och 44 str. Ralångens fstn. 17 aug. 2004.

Mosnäppa *Calidris temminckii*

1 ex 26 juli, 1 ex 3 aug. och 3 ex 16 aug.

Det var något av en besvikelse att inte fler mosnäppor behagade att rasta i år, bättre förutsättningar har ju aldrig tidigare funnits.

Vi har tidigare haft 15 fynd under 70-talet, 17 fynd under 80-talet, 13 fynd under 90-talet och 9 fynd under åren 2000-06.



Mosnäppa

Småsnäppa *Calidris minuta*

1 ad 31 juli.

Som synes är småsnäppan ovanligare än mosnäppan hos oss, men det var tråkigt att inte fler observationer gjordes av dessa småvadare. Orsaken till detta är svårt att förklara.

Det märks en nedåtgående trend på antalet fynd av småsnäppa hos oss, 9 fynd på 70-talet, 8 fynd på 80-talet, 2 fynd på 90-talet och bara ett fynd under åren 2000-06.

Spovsnäppa *Calidris ferruginea*

2 ex 21-22 juli, 1 ex 23 juli, 5 ex 24 juli, 5 ex 1 aug. 6 ex 2-3 aug. 2 ex 4 aug. 3 ex 5-7 aug. och 1 ex 8 aug.


En mycket trevlig överraskning var att så många spovsnäppor rastade. Fynden ligger mycket väl samlade under en två veckors period, och det är omöjligt att utläsa hur många fåglar det rörde sig om.

Vi har tidigare totalt 14 fynd av spovsnäppa. Dessa fördelar sig på 2 fynd på 70-talet, 5 fynd på 80-talet, 2 fynd på 90-talet och 5 fynd under åren 2000-06. Det största antal som setts rasta är 4 ex.

Kärrenäppa *Calidris alpina*

En mycket splittrad fyndbild. Det är inte förrän den 29 juli som man ser en mer koncentrerad sträcktopp, som sedan pågår fram till den 9 aug. Samtliga kärrenäppor var adulta, med ett undantag av 1 ex den 3 aug. Från och med den 16 aug. är det bara 1K-fåglar som ses.


Kärrenäppan har hos oss observerats årligen sedan 1971 (dock ej -93 och -95). Antalet fynd har varierat mellan 1-9. Det tidigare bästa året var 2004 med 9 fynd.



Brushane *Philomachus pugnax*

Hade en tidig sträcktopp redan i slutet av juni (gamla fåglar). Sedan lugnade det ner sig, men under hela juli sågs det brushanar i låga antal. I augusti ökade det igen, och de första ungfåglarna sågs den 14:e. Härefter var det dessa som dominerade bland observationerna.

Brushanen rastar regelbundet vid Hyllingen både under vår- och höststräcket, oftast i små antal av 1-15ex, dock hela 90ex den 15 sep. 1998.



Dvärgbeckasin *Lymnocyptes minimu*

1 ex 2 sept.

När vattnet sjönk undan så bildades det väldigt fina små våtmarker för rastande beckasiner. Därför är det något överraskande att det inte sågs flera. Ett liknande område som finns vid södra delen av Ralången drog till sig mängder med dvärgbeckasiner. Här sågs arten dagligen i oktober, och som mest fanns det 11 ex en kväll

Rastar årligen, och då främst under sydsträcket på hösten. Antalet fynd kan variera kraftigt, mellan 1-5 fynd. Dvärgbeckasinen är en art som man får jobba på genom att vandra igenom våtmarker och aktivt söker efter den.

Enkelbeckasin *Gallinago gallinago*

10-25 ex 16-31 juli, 12-65 ex 1-15 aug. 10-50 ex 16-31 aug. och 12-35 ex 1-15 sep.

Under sommaren fanns det mängder med fina lokaler för rastande enkelbeckasiner, och därför var det helt omöjligt att upptäcka alla. Det var inte förrän någon rovfågel passerade över, som man fick chansen att räkna dem, och därför är säkert siffrorna i underkant av vad som verkligen fanns.

Fälten väster om Hyllingen har alltid attraherat rastande enkelbeckasiner. Normalt rastar ett 50-tal fåglar, men som mest har vi haft 105 ex den 15 aug. 2003.

Myrspov *Limosa lapponica*

1 ex 27 juni, 1 ex sträckande 19 juli, 1 ex 23 juli och 1 ex 5 aug.

Man kan jämföra myrspoven med kustsnäppan. De passerar gärna på sträck över Hyllingen, men att få ned dem till att rasta är högst ovanligt. Därför är årets fyra fynd hel godkänt. Notera en något splittrad fyndbild med 1 ex rastande i varje månad. Juni-fyndet är vårt första genom åren.



Myrspov

Småspov *Numenius phaeopus*

3 ex 27 juni och 1 ex 29 juni

Ännu en art som svek oss. Med så fina förutsättningarna borde fler småspovar rastat. Märkligt att inga observationer gjordes i juli, som annars är den månad då de flesta sydsträckande småspovar ses.



Småspov

Storspov *Numenius arquata*


36 ex 26 juni, 59 ex 27juni, 30 ex 28 juni, 130 ex 29 juni, 30 ex 30 juni, 1-5 ex 1-31 juli, 1-2 ex 2-6 aug. dock 10 ex 5 aug.

En art som reagerade kraftigt på de fina rastmöjligheterna. Under perioden 26-30 juni så noterades mycket höga antal rastande storspovar för vår del. Dock verkade det som de flesta spovarna hade riktigt bråttom mot syd, så det verkliga antalet som passerade Hyllingen dessa dagar kan vara betydligt högre än det vi såg. Flocken på 130ex är den största som har rastat vid Hyllingen, tidigare bästa dag var 60ex den 29 juni 1973 (alltså samma datum som i år). I juli gjordes endast spridda observationer av ett fåtal individer, samma även i augusti, dock med ett undantag då 10 ex observerades den 5 aug. Dessa bör ha varit ungfåglar.

Svartsnäppa *Tringa erythropus*

Helt programenligt sågs de första svartsnäpporna i slutet av juni. I juli uppträdde arten mer eller mindre regelbundet men inte i några större antal, dock sågs 7 ex den 30 juli och 6 ex den 2 augusti. Från och med den 1 augusti var det bara 1K-fåglar som rastade.


Svartsnäppan ses årligen rasta under både vår- och höststräcket, men sällan i några större antal. Dock finns ett undantag, då 48 ex rastade den 9 maj 1986.



Rödbena *Tringa totanus*

Rödbenan reagerade kraftigt på de fina rastbetingelserna, och flocken på 55ex är den största vi har sett på 40 år!! Det gamla rekordet var på 24 ex ifrån Hyllingen den 15 maj 1967. Hela 30 dagar med rastande rödbenor är ju fantastiskt kul.

Rödbenan rastar vid Hyllingen årligen men i mycket små antal och då sällan över 5ex. Vissa år görs det bara 1-2 fynd.




Gluttsnäppa *Tringa nebularia*

Gluttsnäppan avvek något ifrån övriga *Tringa*-vadare genom att inte ha någon sträcktopp i slutet av juni. Inte förrän vi kom in i juli så började den rasta i större antal. Flocken på 40 ex är den största vi har sett i Aneby.

Gluttsnäppan är en regelbunden rastfågel vi Hyllingen men sällan i antal över 10 ex.

Gluttsnäppa



Skogssnäppa *Tringa ochropus*

1 ex 21-26 juni, 1 ex 8-15 juli, 1-5 ex 16-31 juli dock 10 ex 26 juli och 16 ex 27 juli, 2-5 ex 1-15 aug. dock 8 ex 3 aug. och 10 ex 2 aug. och 1-3 ex 16 aug.-1 sep.


Skogssnäppan är en art som man sällan ser rasta i några större antal, så därför var det några datum som avvek ifrån detta, nämligen 26-27 juli och 2-3 aug. Förutom dessa dagar i månads-skiftet juli/augusti så var det en jämn förekomst under hela sommarn.

Grönbenä *Tringa glareola*

Hade en sträcktopp i slutet av juni, sedan var arten helt försvunnen en vecka för att åter ha en ny topp den 7-8 juli. Härefter sågs arten med 1-7 ex fram till den 22 juli då antalet rastande grönbenor ökade igen och sågs mer regelbundet fram till den 24 aug. (ungfåglar).

Grönbenan rastar regelbundet vid Hyllingen under både vår- och höststräcket. Flockar på över 100 ex brukar vi bara observera på vårsträcket i maj.

Grönbenä





Grönbenä

Drillsnäppa *Actitis hypoleucos*

1-9 ex 17-31 juli dock 11 ex 28 juli och 12 ex 26 juli, 2-11 ex 1-15 aug. dock 15 ex 4-5 aug. samt hela 19 ex 3 aug. samt 1-4 ex 16-21 aug.

Drillsnäppan har en väldigt likartad flyttning som skogssnäppan. Den väljer gärna att rasta i små antal. I materialet ser man också att sträcktoppen inföll nästan samtidigt som hos skogssnäppan. Däremot så skiljer sig startdatum. Inte förrän den 17 juli såg vi de första drillsnäpporna.

Roskarl *Arenaria interpres*

1ex 1K 30 aug.

En efterlängtnad art, men det var nästan så hela sommarn gick, innan den behagade rasta hos oss.

Vi har tidigare ett fynd av roskarl i Aneby. Det var den 1 maj 2006, som en adult hane rastade en kort stund vid Hyllingen.

Övriga arter

Allt vatten hade nu gjort Hyllingen till en enda stor fågelsjö. Det var inte bara vadare som hade upptäckt detta. Mängder med gäss, änder och tranor rastade också. Under 2000-talet har **grågåsen** ökat som rastfågel hos oss. Dessa var inte sena att utnyttja Hyllingen. Den 2 juli räknades det in 225 ex. Sedan steg antalet sakta och nådde sitt maximum den 9 aug. med 320 ex. Det fanns gott om **gräsand**, och den 26 juli kunde vi räkna dom till 150 ex. En mycket ovanlig rastfågel i Hyllingen är **skäggdopping**, men denna sommar passade honom. 1 ex sågs vid flera tillfällen och 2 ex rastade den 10 juli. När det finns många fåglar, så finns det ju också mycket mat. Detta visste ju alla rovfåglar. Flera **bruna kärrhökar** patrullerade gärna över vattenytorna. Även **duvhöken** tog en lov ibland. Tydligt hade en del fisk vandrat upp från Ralången, för det var flera **fiskgjusar** som fiskade dagligen. Vattnet hade stigit så högt att kommunens vattenverk även var påverkad. Här inne spelade nu en **vattenrall** vilket aldrig har hänt tidigare. Samma ökning som jag nämnde om för grågåsen har även **tranan** haft hos oss. Tranor brukar samla sig i aug.-sep. Men redan nu i juli anlände ett 60-tal fåglar, som drog runt sjön och gav ett härligt liv åt Hyllingen. Andra arter som också bidrog till att höja känslan av en fågelsjö var måsarna, och då framförallt **skrattnås** vilken rastade i stora mängder.

Intressanta observationer

Bläsand *Anas penelope*

5 ex 27-30 juni, 2 ex 5-7 juli, 9 ex 10 juli, 1-4 ex 17-19 juli, 2-6 ex 21 juli- 1 aug. 1 ex 5 aug. 2 ex 10 aug. och 2 ex 25 aug.

Observationer av bläsand i juni-juli är hos oss ganska ovanligt. Arten sågs hela sommaren, men i låga antal och någon egentlig sträcktopp går inte att utläsa.

Snatterand *Anas strepera*

10 ex 27-28 juni och 4 ex 29-30 juni.

Det var första gången som snatterand observerades i Aneby under juni månad. Flocken på 10ex är med råge den största som har observerats. Tidigare hade vi som mest 2ex.



Snatterand

Kricka *Anas crecca*

10 ex 22 juni, 25 ex 23 juni, 50 ex 27 juni, 175 ex 30 juni, 100 ex 1 juli, 25-50 ex 2-27 juli, 86 ex 29 juli, 100 ex 7 aug. 50-75 ex 10-19 aug. och 100 ex 20- 26 aug.

Under april och augusti kan krickan rasta med tresiffriga antal i Hyllingen, som mest har det setts 150-200 ex. Men förutsättningarna i år verkade väldigt gynnsamma, och höga antal rastande krickor observerades hela sommarn. 100 ex eller mer noterades vid fem tillfällen, helt fantastiskt.

Stjärtand *Anas acuta*

3 ex 30 juli, 2 ex 31 juli, 3 ex 1 aug. 2 ex 7 aug.

Stjärtanden är hos oss sparsamt förekommande, men den ses dock årligen. Under alla år så har vi bara observerat den vid tre tillfällen tidigare i juli. Det är svårt att avgöra om det är samma fåglar hela tiden, eller det har varit nya varje gång.

Årta *Anas querquedula*

1 ex 30 juni, 1 ex 18-19 juli, 1 ex 24 juli, 3 ex 26 juli, och 1 ex 30 juli

Troligen häckade årta vid Hyllingen 2002, men förutom det året så är årtan ovanlig hos oss sommartid. Vi har bara ett julifynd. I år kan det ha varit en och samma årta hela tiden, men det var ju bevisligen 3 ex den 26 juli. Dessa var uppe och flög en runda, vilket underlättar vid artbestämning på sommaren.



Årta

Skedand *Anas clypeata*

20 ex 27-28 juni, 14 ex 29-30 juni, 16 ex 2 juli, 5 ex 5 juli, 1-2 ex 10 juli- 1 aug. 7 ex 17 aug. 1 ex 18-26 aug. och 6 ex 27 aug.

Visserligen har vi en observation på 22 rastande skedänder i Anebysjön 2 maj 2006. Men fränsett den, så är det ovanligt hos oss med över 10 rastande skedänder. Därför var det en fantastisk syn med ett stort antal rastande skedänder under perioden 27 juni-2 juli.

Brunand *Aythya ferina*

2 ex hanar 27 juli, 1 par 5 juli, 1 hane 10 juli och 1 par 13 juli

De stora vattenmängderna var inte något som lockade brunanden till att rasta hos oss.

Vigg *Aythya fuligula*

10 ex 27 juni, 5 ex 28 juni, 12 ex 7-9 juli och 1-5 ex 10-25 juli

Rastande vigg i juni och början av juli är mycket ovanligt hos oss. De stannade en hel månad, men inte i några större antal.

Smådopping *Tachybaptus ruficollis*

1 ex 12 aug.

Smådoppingen ses inte årligen i Aneby kommun. Totalt finns det 26 fynd sedan 1967 varav 12 är gjorda i Hyllingen. Tidigare finns det 2 augustifynd.

Vit stork *Ciconia ciconia*

1 ex 22 juli kl 11:40-12:30

Sedan 1963 har vit stork setts vid 4 tillfällen i Aneby kommun, och senast den gästade Hyllingen var den 12-23 juli 1980.



Vit Stork

Havsörn *Haliaeetus albicilla*

1 ad 26 juli, 1 ex 1K 2 aug. och 1 ex 3K+ 6 aug.

Observationerna av havsörn har ökat kraftigt under 2000-talet. Med en lyckad häckning i vår grannkommun både 2006 och 2007 så ser framtiden mycket ljus ut.

Röd glada *Milvus milvus*

1 ex 13 juli

Med 2 fynd på 80-talet och 4 fynd på 90-talet var gladan förr en riktig raritet. Men under senare år har något positivt hänt. Under åren 2003-06 har vi haft 13 fynd och de flesta är då gjorda i Hyllingenområdet.



Röd Glada

Blå kärrhök *Circus cyaneus*

1 hane 21 aug.

Ett normalt datum då vi brukar se de första höstflyttande blåhökarna i våra trakter.

Pilgrimsfalk *Falco peregrinus*

1 ex 22 juli, 1 ex 9 aug. och 1 ex 2 sep.

Pilgrimsfalken har under senare år haft en likartad utveckling som jag nämnde om gladan. Under 80-talet gjordes 6 fynd som sedan ökade till 10 fynd på 90-talet, och under åren 2000-06 har vi haft 17 fynd. En av orsakerna till ökningen kan vara att det numera finns ett häckande par i Sommen.

Sothöna *Fulica atra*

4 ex 12 aug. och 1 ex 13 aug.

En vanlig våtmarksart i övriga Sverige, men hos oss är den konstigt nog ganska ovanlig.

Silltrut *Larus fuscus*

1 ad 27 juni

Silltruten observeras så gott som årligen, men då oftast bara med 1 ex. Förutom 2001 med 8 fynd och 2002 med 5 fynd, så har endast 1-3 fynd gjorts övriga år.

Svarttärna *Chlidonias niger*

1 ad 17 juli

Svarttärnan är hos oss en sällsynt sträckgäst. Vi har bara 6 fynd varav 5 är gjorda i maj och ett i augusti. Detta var första gången som arten observerades i juli månad.

Till sist...

Ett stort TACK till Douglas Gustafsson som har läst igenom och lämnat värdefulla synpunkter på denna artikel.

För att inte några missförstånd skall uppstå så vill vår fotograf informera om att inte alla av de bilder som finns med i denna artikel är fotograferade vid Hyllingen.

Aneby i december 2007

Mats Thorin & Peter Hörenius



Hyllingens naturreservat 29 juni 2007.

Foto: Robin Eriksson